

Hozzájárulási nyilatkozat a káliumjód tabletták szedéséhez.

Kedves Szülők és Jogi képviselők!

A csernobili reaktor-baleset Csernobil erős sugárzásnak kitett környékein gyerekeknél és fiataloknál a sugárzás okozta pajzsmirigyrák erős megszorodásához vezetett. Ennek rádióaktív jód az oka, ami reaktorok baleseténél hatalmas mennyiségben felszabadul. Miután ezt az emberi test felvette, a pajzsmirigy ezt tárolja és ott nagy helyi sugárzást megterheléshez vezet.

Az időben beszedett káliumjód tabletták stabil jóddal telítik a pajzsmirigyét és ezáltal megakadályozza a rádióaktív jód tárolását. Ennek köszönhetően a pajzsmirigy sugárzás általi megterhelése és ezáltal a sugárzás okozta pajzsmirigyrák felmerülése gyakorlatilag nullára süllyedt. Ennek az előfeltétele azonban az, hogy a tablettát még a rádióaktív légmennyiség betörése előtt kell bevenni.

A káliumjód tabletták idejében való beszedése felettébb határos védelmet nyújt a sugárzás okozta pajzsmirigyrák ellen.

A tabletták idejében való beszedése érdekében az iskolákban és intézetekben káliumjód tablettákat tárolunk. A gyermekük ellátását azonban kizárólag az Önök előzetes hozzájárulásával lehet biztosítani. Az alábbi hozzájárulási nyilatkozat aláírásával Önök lehetővé teszik gyermekeik számára a tabletták kiadását.

Reaktor-baleset esetében a káliumjód tablettákat csak az egészségügyi hatóság nyomtatékos felszólítására adjuk ki.

Mielőtt megadnák hozzájárulásukat, kérjük, hogy olvassák el figyelmesen a káliumjód tabletták használati utasítása kivonatának mellékelt adatait.

Az igazgatóság

HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT

A gyermek neve: _____ Születési dátuma: _____

A jogi képviselő neve:

- IGEN, ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy (az intézmény látogatásának tartamára az egészségügyi hatóság felszólítására gyermekemnek káliumjód tablettákat adjanak. Igazolom, hogy gyermekem a tabletták beszedésével kapcsolatban semmilyen összeférhetetlenség vagy ellenjavallat jeleit nem mutatta, valamint azt is, hogy ezeknek felmerülő ismeretében az iskolát erről haladéktalanul értesítem.
- ONEM, nem járulok hozzá.

Datum: _____

Aláírás: _____

Felvilágosítás a káliumjodid-tablettákról (értelemszerűen kivontuk a használati utasításból)

Káliumjodid-tablettákat tilos bevenni, amennyiben:

- **pajzsmirigy-túltengés** áll fenn,
- **a pajzsmirigyben képződött, jóindulatú csomók esetében**, amiket nem kezelnek. Az ú.n. kezeletlen „forró pajzsmirigy-csomóknál” fennáll az a veszély, hogy pajzsmirigy-hormon masszív túltermelésére kerül sor, ami legrosszabb esetben a szív és a vérkeringés életveszélyes reakcióját válthatja ki.
- **Jóddal szembeni allergia (túlérzékenység) esetében**. Ez felettebb ritka és nem összetévesztendő a gyakori, kontrasztanyagok elleni allergiával (amelyek pl. a röntgendiagnosztikánál egyes szervek jobb láthatósága érdekében használatosak).
- **Tabletták** egyéb egyik összetevőjével szemben (kukorica-keményítő, laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, alkalikus Butilmethacrilat-kopolimer, magnéziumsztearát) fellépő **allergia** esetében
- **Dermatitis herpetiformis Duhring** (hólyagocskák, bőrpirosodás, kiütés, csalánkiütés és első sorban a könyökön és térden fellépő, fokozott viszketegség) fennállásánál.
- A **véréredényfalak** allergiára visszavezethető **gyulladás**a esetében (Hypokomplementaemiás érgyulladás).

Különös óvatosságot igényel a káliumjodid-tabletta bevétele következő esetekben:

- A **pajzsmirigy rosszindulatú daganatára** utaló gyanúnál. A pajzsmirigy daganatot radioaktív jóddal kezelik. Ha radioaktív jódot nagy mennyiségben szedünk, akkor ez a daganatkezelést lehetetlenné teheti.
- Olyan megbetegedéseknél, amik a **légcsövet** érintik. Nagy mennyiségű jódadagok megnövelhetik a pajzsmirigyvet, ami által a légcső már fennálló beszűkülése még rosszabb lehet.
- Amennyiben az Ön gyermekét **pajzsmirigyhormont gátló szerrel** (Thyreosztatika) kezelik. Kérjük, forduljon orvosához és kérdezze meg, hogy gyermeke szedhet-e káliumjód tablettákat.

Káliumjód tabletták egyidejű szedése más gyógyszerrel

- **A káliumjód tabletták hatását merőben befolyásolják:** olyan gyógyszerek, amelyek a pajzsmirigy anyagcseréjét befolyásolják (pl. Perchlorat, Thiocyanat 5 mg/dl-t meghaladó koncentrációban). Ezek megakadályozzák a jód a pajzsmirigyben keresztüli felvételét.
- **A káliumjód tabletták befolyásolják a hatást:** pajzsmirigyhormont gátló szereknél (Thyreosztatika)

Káliumjodid G.L. laktózt tartalmaz. Ezért kérdezze meg az orvosát, hogy gyermeke szedhet-e káliumjodid tablettát, ha Ön tudja, hogy gyermeke cukornál fellépő összeférhetetlenségben szenved.

Milyen mellékhatásokra kell számítani?

Mint minden gyógyszer, a káliumjodid tablettának is lehetnek mellékhatásai, amelyek azonban nem kell, hogy mindenkinél fellépjenek.

Következő mellékhatásokat figyeltek meg:

Ritkán fellépő esetekben (1000 kezelt beteg közül 1-nél):

- ismeretlen jód-allergia első ízben felléphet. Ezek allergikus tünetek képében mutatkozhatnak, pl. bőrpirosodásban, a szem viszketésében és égésében, nátha formájában, száraz köhögés, hasmenés, fejfájás és hasonló panaszok formájában.

Dermatitis herpetiformis Duhring (hólyagocskák, bőrpirosodás, kiütés, csalánkiütés és első sorban a könyökön és térden fellépő, fokozott viszketegség) esetében életveszélyes reakciók léphetnek fel (lásd fent: „Káliumjodid-tablettákat tilos bevenni”).

- Véredények gyulladása esetében (pl. Periarteriitis nodosa).

Nagyon ritkán (10.000 kezelt beteg közül 1-nél):

- a pajzsmirigy jód okozta túltengése vagy hipofunkciója. A pajzsmirigy túltengése

a pulzus fokozott működésével, verejték kitöréssel, álmatlansággal, remegéssel, hasmenéssel és fokozott étvágy ellenére fellépő testsúly-vesztéssel jelentkezhet. Ilyen panaszok jelentkezésénél forduljanak orvoshoz.

Ismeretlen (a rendelkezésre álló adatok alapján a gyakoriság ismeretlen):

- A gyomornyálka ingerlése különösen a káliumjodid tablettának éhgyomorra való bevétele miatt léphet fel.
- A nyálkamirigy gyulladása.
- A gyomor-bél-traktus panaszai
- A bőr enyhe kiütése.

Általánosságban következő a teendő:

Amennyiben további felvilágosításra vagy tanácsra lenne szüksége, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.