

Izjava o pristanku za uzimanje tableta kalijum-jodida

Dragi roditelji! Dragi staratelji!

Černobilska nuklearna nesreća dovela je u jako kontaminiranim područjima oko Černobila kod djece i adolescenata do naglog porasta raka štitnjače uzrokovanog zračenjem. Uzrok tome je radioaktivni jod koji se kod teških nuklearnih nesreća oslobađa u velikim količinama. Nakon što ga tijelo apsorbira, taj radioaktivni jod se nakuplja u štitnoj žlijezdi i izlaže je visokoj dozi zračenja.

Pravovremenim uzimanjem tableta kalijum-jodida štitnjača se zasićuje stabilnim jodom čime se sprečava apsorpcija radioaktivnog joda. Na taj način se izlaganje štitne žlijezde zračenju, a samim time i nastanak raka štitnjače uzrokovanog zračenjem praktično svodi na nulu. Pretpostavka za to je međutim da se tablete uzmu prije nego što radioaktivni oblak stigne u neko područje.

Pravovremeno uzimanje tableta kalijum-jodida pruža vrlo djelotvornu zaštitu od raka štitnjače uzrokovanog zračenjem.

Da bi se omogućilo pravovremeno uzimanje, škole i internati drže zalihe tableta kalijum-jodida. Mogu se međutim dati Vašem djetetu samo uz Vaš prethodni pristanak. Potpisom niže navedene Izjave o pristanku možete omogućiti davanje tableta Vašem djetetu.

U slučaju nuklearne nesreće, tablete kalijum-jodida daju se samo na izričit zahtjev od strane Službe za zaštitu od zračenja.

Molimo da prije svog pristanka pažljivo pročitate priložene informacije iz uputstva za upotrebu tableta kalijum-jodida.

Direkcija

IZJAVA O PRISTANKU

Ime: _____ datum rođenja: _____

Ime roditelja/staratelja: _____

- DA, ovim dajem svoj pristanak da se mom djetetu (za vrijeme boravka u ovoj ustanovi) na zahtjev od strane Službe za zaštitu od zračenja daju tablete kalijum-jodida. Potvrđujem da mi kod mog djeteta nisu poznate nikakve netolerancije ni kontraindikacije za uzimanje tih tableta i da ću u slučaju da saznam za neke netolerancije ili kontraindikacije, o tome odmah obavijestiti školu.
- NE, ne dajem svoj pristanak.

Datum: _____

Potpis: _____

Informacije o tabletama kalijum-jodida (prema informacijama iz uputstva za upotrebu)

Tablete kalijum-jodida ne smiju se uzimati:

- kod **pojačane funkcije štitnjače (hipertireoze)**
- kod **dobročudnih čvorova u štitnjači** koji se ne liječe. Kod takozvanih neliječenih „vrućih čvorova u štitnjači“ postoji opasnost od prekomjerne proizvodnje hormona štitnjače što u najgorem slučaju može uzrokovati kardiovaskularne reakcije opasne po život.
- kod **alergije** (preosjetljivosti) na jod koja je vrlo rijetka. Ne smije se zamijeniti s alergijom na kontrastna sredstva (koja služe boljem prikazu raznih organa kod dijagnostičkih slikovnih postupaka kao što je npr. rendgenska dijagnostika), koja je dosta česta.
- kod **alergije** na neki od ostalih sastojaka tableta (kukuruzni škrob, laktoza-monohidrat, mikrokristalna celuloza, bazični butil-metakrilat kopolimer, magnezijum-stearat).
- kod **dermatitisa herpetiformis Dühring** (oboljenje kod kojeg se javljaju mjehurići, crvenilo kože, kožni osipi, urtike i jaki svrbež koji peče i koji se prvenstveno javlja na laktovima i koljenima).
- kod alergijski uzrokovanih **upala zidova krvnih žila/sudova** (hipokomplementarni vaskulitis).

Poseban oprez kod uzimanja tableta kalijum-jodida potreban je:

- kod sumnje na **zloćudan tumor štitnjače**. Tumori štitne žlijezde liječe se radioaktivnim jodom. Uzimanje kalijum-jodida u velikim količinama može onemogućiti liječenje tumora.
- kod oboljenja koje zahvaća **dušnik**. Davanje velikih količina joda može izazvati rast štitnjače, što dodatno pogoršava postojeće suženje dušnika.
- ako se Vaše dijete liječi **lijekovima koji inhibiraju proizvodnju hormona štitnjače (tireostaticima)**. Molimo da pitate svog ljekara/liječnika da li Vaše dijete smije uzimati tablete kalijum-jodida.

Uzimanje tableta kalijum-jodida s drugim lijekovima

- **Na djelovanje tableta kalijum-jodida utiču:**
lijekovi koji utiču na metabolizam štitnjače (npr. perklorat, tiocijanat u koncentraciji većoj od 5 mg/dl). Oni inhibiraju apsorpciju joda u štitnjači.
- **Tablete kalijum-jodida utiču na djelovanje:**
lijekova koji inhibiraju proizvodnju hormona štitnjače (tireostatici)

Kaliumjodid G.L. sadrži laktozu. Molimo da pitate svog ljekara/liječnika da li Vaše dijete smije uzimati tablete kalijum-jodida ako Vam je poznato da Vaše dijete ima netoleranciju na laktozu.

Koje nuspojave su moguće?

Kao svi lijekovi, tako i tablete kalijum-jodida mogu imati nuspojave koje se međutim ne moraju pojaviti kod svakoga.

Uočene su sljedeće nuspojave:

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1.000 osoba):

- može se pojaviti alergija na jod koja do tada nije bila poznata. Pritom može doći do alergijskih reakcija kao što su npr. crvenilo kože, svrbež i peckanje u očima, hunjavica, nadražujući kašalj, proljev, glavobolja i slične tegobe. Naročito kod postojećeg dermatitisa herpetiformis Dühring (oboljenje kod kojeg se javljaju mjehurići, crvenilo kože, kožni osipi, urtike i jaki svrbež, prvenstveno na laktovima i koljenima) mogu se pojaviti reakcije opasne po život (vidi gore: „Tablete kalijum-jodida ne smiju se uzimati“).
- upale krvnih sudova/žila (npr. periarteriitis nodosa).

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10.000 osoba):

- pojačana ili smanjena funkcija štitnjače uzrokovana jodom. Znakovi za pojačanu funkciju štitnjače mogu biti povišen puls, znojenje, nesanica, tremor, proljev i gubitak tjelesne težine unatoč povećanom apetitu. Kod takvih tegoba potrebno je da se obratite ljekaru/liječniku.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- nadražaj želučane sluzokože do čega može doći prije svega ako se tablete kalijum-jodida uzimaju na prazan želudac.
- upala žlijezda slinovnica
- tegobe u želučano-crijevnom traktu
- blagi kožni osipi

Generalno važi:

Ako su Vam potrebne dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekaru/liječniku ili apotekaru/ljekarniku.